

Blutoxol

Flydende desinfektionsrengøringsmiddel koncentrat til levnedsmiddelområdet

- ▲ Hurtigt virkende køkkendesinfektionsrengøringsmiddel
- ▲ EN-kontrolleret og IHO-listet rengørings- og desinfektionsmiddel til overfladedesinfektion
- ▲ Effektiv mod salmonella, listeria og norovirus
- ▲ Effektiv mod SARS-CoV-2 (EN 14476, EN 16777)
- ▲ Fjerner fedt, olie og protein
- ▲ Uden duftstoffer
- ▲ Alkalisk
- ▲ En ubetænkelighedsattest for brug inden for fødevarerområdet



Anvendelsesområder

Til rengøring og desinficering af vand- og alkalibestandige gulv-, væg-, og arbejdsoverflader samt køkken- og arbejdsredskaber i fødevarerforarbejdende virksomheder. Ikke på alkalifølsomme overflader eller overflader, der er plejet med 1-komponents-polish.

Anvendelse

Før anvendelsen testes materialets egnethed på et ikke synligt sted. 1 dosering = 25 ml.

Fremstilling af brugsopløsning:

Opløsningen skal altid blandes med koldt vand. Dosering se tabel. Fyld 500 ml skumdysseflasken til markering med koldt vand og tilføj 1 dosering fra 1-L-koncentratflasken eller via et Kiehl-doseringssystem (f.eks. DosiExpress). 500-ml-skumdysseflasken fyldes via et egnet Kiehl-doseringssystem (f.eks. DosiStation, DosiJet). Anvend 2-L- og 5-L-beholderen via et egnet Kiehl-doseringssystem (f.eks. DosiStation, Arcantec, DosiJet).

Desinficerende rengøring:

Væd hele arealet med desinfektionsløsningen (ca. 15–20 ml/m²), og bearbejd med rengøringstekstil eller rengøringsapparat. Forbrug: 0,1 ml/m².

Overflader og køkkenredskaber, der kommer i direkte kontakt med fødevarer, skal efter indvirkningstiden skylles grundigt med ferskvand. Ved fedt- eller proteinaflejringer skal produktet påføres i den tilsvarende anvendelseskoncentration (koldt), og efter påvirkningstiden ved skrubning kommes varmt vand på gulvet via maskinens lufttank.



Bemærk

Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet. Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 11 Biocidprodukter skal anvendes forsigtigt. Skiltet og produktinformationerne skal altid læses inden brug.
DK: Levnedsmiddelstyrelsen Jr. No 2015-29-7105-00078, PT 04

Indhold (iht. 648/2004/EF)

Nonioniske overfladeaktive stoffer < 5 %, organisk salt, uorganisk salt, biocider, farve.

pH-værdi (koncentrat): ca. 13

pH-værdi (brugsopløsning): ca. 11

Virkemidler pr. 100 g:

2,4 G Didecyltrimethylammoniumchlorid (CAS: 7173-51-5), 1,9 g Alkyltrimethylammoniumchlorid (CAS: 68391-01-5).

Varenummer	Forpackningsenhed (FPE)	Antal FPE pr palle
j550302	6 x 1 L doseringsflasker (karton)	84
j550308	3 x 2 L flasker (karton)	130
j550305	2 x 5 L dunke (karton)	56

Blutoxol

Flydende desinfektionsrengøringsmiddel koncentrat til levnedsmiddelområdet

Faremærkning

Faremærkning (i koncentrat): GHS05, GHS09, Fare. H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. H400 Meget giftig for vandlevende organismer. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. P273 Undgå udledning til miljøet. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Indeholder: Potassium Silicate / Benzalkonium Chloride (INCI)

Test og godkendelser

Doseringsanbefaling for overfladedesinfektion i industriel, institutionel og fødevarerområdet

Testmetode	Virkningsområde	Belastning	Dosering		Indvirkningstid
EN 13697 Overfladedesinfektion uden mekanik	baktericid / levurocid	høj	5 %	500 ml/10 L	60 min
EN 16777 Kvantitativ overflade- forsøg	begrænset virucid*				

Yderligere tests

Testmetode	Virkningsområde	Belastning	Dosering		Indvirkningstid
industriel, institutionel og fødevareområdet					
EN 1276 Kvantitativ susper- sionsforsøg	baktericid	lav	2 %	200 ml/10 L	5 min
EN 1650 Kvantitativ susper- sionsforsøg	levurocid	lav	0,5 % 1 %	50 ml/10 L 100 ml/10 L	15 min 5 min
		høj	2 % 3 %	200 ml/10 L 300 ml/10 L	15 min 5 min
EN 13697 Overfladedesinfektion uden mekanik	baktericid	lav	7,5 %	750 ml/10 L	5 min
		høj	5 %	500 ml/10 L	30 min
EN 13697 Overfladedesinfektion uden mekanik	levurocid	lav	3 % 2 %	300 ml/10 L 200 ml/10 L	15 min 30 min
		høj	4 % 3 %	400 ml/10 L 300 ml/10 L	15 min 30 min
virucidi					
EN 14476 Kvantitativ susper- sionsforsøg	begrænset virucid*	høj	7,5 %	750 ml/10 L	60 min
	Norovira	lav	7,5 % 5 %	750 ml/10 L 500 ml/10 L	30 min 60 min
		høj	7,5 %	750 ml/10 L	30 min
EN 16777 Kvantitativ overflade- forsøg	begrænset virucid*	høj	7,5 % 5 %	750 ml/10 L 500 ml/10 L	30 min 60 min

* iht RKI-anbefaling Bundesgesundheitsblatt 01/-2004, se også www.desinfektionsmittelliste.de